



“DOĞRU GÜBRE, MAKSİMUM VERİM!”



GROWWAY

“ The new solutions ”



“DOĞRU GÜBRE, MAKSİMUM VERİM!”



30 yıllık tecrübemiz ve modern üretim tesisimizde farklı gruplarda tarımsal ihtiyaçlarınıza yönelik 50’den fazla spesifik gübre üretmekteyiz. Gelişen ve değişen tarım sektöründe; dinamik, tecrübeli ve sürekli kendini yenileyen firmamız, bugün üretmiş olduğu ürünlerin kalitesi, bilgi ve tecrübesiyle ön plana çıkarak büyük bir marka haline gelmiştir.

Neden Growway?

Şirketimiz kurulduğu günden bu yana ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda insanımıza, toprağımıza özgün, faydalı ve kaliteli birçok ürünü tarım sektörüne kazandırmıştır. Tarımla iç içe geçen bu 30 yıl tarım uygulamalarına farklı çözümler getirmenin sorumluluğunu yükledi.

Growway çatısı altındaki uzman teknik kadromuz, yeni formülasyonları bünyemize kazandıran ve sürekli gelişen Ar-ge departmanımız ürünlerimizin mutlak başarısını sağlamakta ve aldığımız bu sorumluluğu yerine getirmeyi mümkün kılmaktadır. Ülkemizin farklı bölgelerinde, değişik arazi ve iklim koşullarında tarımsal uygulamalara çözüm sunabilen Growway patentli ürünlerimiz, bayilerimiz ve üreticilerimiz tarafından benimsenmekte ve üretimin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmektedir.

Growway için taviz verilemeyecek tek prensip kalite ve yeniliktir. Bu ilkemiz doğrultusunda, sahip olduğumuz modern üretim tesisimiz, çeşitli ürün yelpazemiz, tecrübeli teknik kadromuz, kaliteli Ar-ge departmanımız, kurumsal yapımız ve geniş satış faaliyetlerimiz ile "Tarımda Yeni Çözümler" sloganıyla ülkemize ve dünyamıza hizmet etmekten mutluluk duymaktayız.



Uzman Kadro, Yenilikçi ve Kaliteli Yaklaşım

İşimize olan tutkumuz ve yıllar içerisinde edindiğimiz deneyim, bizi keskin bir profesyonelliğe, performans ve kalitede yüksek standartlara ulaştırdı. Dünyanın pek çok ülkesindeki müşterilerimiz, Growway ürünleri ile bilimsel gelişmeleri takip eden, her gübrenin etkisini tek tek test eden ve geliştiren bir ekibin sunduğu yüksek kalite sahibi ürünler ile yüksek standartlar elde edebileceklerini çok iyi biliyorlar.



Bitki ve Toprak Sağlığını Gözetken Doğa Dostu Üretim

Üretimde gösterdiğimiz İstikrarlı ve sürekli gelişim, ürünlerimizin bitki ve toprak sağlığını gözetken doğada ağır metal ve negatif etki bırakmayan yüksek verimliliğe sahip ürünler olmasını sağlar. Çevre dostu olmak konusundaki hassasiyetimiz sadece ürettiğimiz gübrelere verimliliği ve doğa dostu olmasıyla değil, üretim sırasındaki düşük enerji kullanımımızla da ön plana çıkmaktadır.



Çiftçinin Yüzünü Güldüren Doğru Çözümler.

Başarımızın sırrı, temel ilkemiz olan dürüstlük! Bu ilke firmamızda her düzeyde önemlidir ve satıcı, müşteri, kurumlar gibi ilgili tüm taraflarda etki eder. Dürüstlük ilkemizle sunduğumuz ürünlerde çiftçinin yüzünü güldürecek, bitki sağlığı ve hasatta yüksek verim elde eden kaliteli gübrelere düşük maliyetle sunmayı amaçlıyoruz.

BIOSTIMULANT SERİSİ



- AMINOX
- ONYX
- POLYWAY
- TOTEM
- PROWAY 312
- PROWAY 239
- ALGAWAY
- ADRESS

AMINOX

SPECIAL SERIES

HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Organik Madde	%40
Organik Karbon (C)	%15
Organik Azot (N)	%7
Serbest Amino Asit Miktarı	%10
pH aralığı 5,5 - 7,5	

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Sert çekirdekli	Döllenmeden renk dönüşümüne kadar yapraktan 4-5 uygulama. 150-200cc./100lt.
Elma, Armut	Çiçek öncesinden meyve büyüene kadar yapraktan 3-4 uygulama. 100-150cc./100lt.
Bağ	Salkım oluşumundan sonra renk dönüşümü öncesine kadar yapraktan 2-3 uygulama, 100-150cc./100lt.
Domates, Biber, Patlıcan, Kabakgiller, Patates, Soğan, Çilek, Kavun, Karpuz	Çiçeklenmeden itibaren hasada kadar yapraktan 2-3 uygulama, 100-150cc./100lt. damlamadan 1 lt./da. Dozunda çiçeklenme ve hasat döneminde uygulanabilir.
Narenciye	Çiçek döneminde, petal yaprakların dökümün haziran dökümünden sonra yapraktan birer uygulama, 100-150cc./100lt.
Yapraklı Sebzeler, Süs Bitkileri, Çiçekler	Dikimden sonra hasada kadar yapraktan 2-3 uygulama 100-150cc./ 100lt. su dozunda uygulanır. Damlamadan 1lt./da. Dozunda çiçeklenme ve hasat döneminde uygulanabilir.

Kullanım dozları yapraktan veya damla sulama uygulaması ile dekar başına 100 lt suya göre hesaplanmıştır

- Hücre bölünmesini artırır.
- Meyve boyutunu ve kuru madde miktarını artırır.
- Uniform ve hızlı meyve büyümesini sağlar.
- Bitkide stres koşullarında stres giderici olarak görev yapar.

Ayrıca gözleri uyarır, filizlenmeyi artırır, besinlerin taşınmasını kolaylaştırır, meyvelerin ve yaprakların yaşlanmasını, dökülmesini geciktirir. Tüm bitkiler için eşsiz bir enerji kaynağıdır. Besin maddelerini kompleksler ve bitki bünyesine taşır. Çevresel ve iklimsel stres ortamlarında hücre ve bitkilerin büyümesini teşvik eder, strese karşı bitkiyi korur. Bitkinin vejetatif gelişmesini kontrol altında tutarak, çiçeklenmeyi, döllenmeyi ve döllenmesini tamamlayan meyve ve sebzelerin büyümesini teşvik eder. Gübrelerle birlikte verildiğinde, gübreyi bitkiye taşır. Verim artışı sağlar. Organik tarımda kullanılır.

HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE



Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Organik Madde	%50
Organik Karbon (C)	%20
Organik Azot (N)	%8
Serbest Amino Asit Miktarı	%10
pH Aralığı 5,5 - 7,5	

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Sert Çekirdekli	Döllenmeden renk dönüşümüne kadar, yapraktan 4-5 uygulama, 150-200cc./100lt.
Elma, Armut	Çiçek öncesinden meyve büyüene kadar, yapraktan 3-4 uygulama, 15-200cc./100lt.
Bağ	Salkım oluşumundan sonra renk dönüşümü öncesine kadar yapraktan 2-3 uygulama, 150-200cc./100lt.
Domates, Biber, Patlıcan, Kabakgiller, Patates, Soğan, Çilek, Kavun, Karpuz	Çiçeklenmeden itibaren hasada kadar yapraktan, 2-3 uygulama, 100-150cc./100lt. damlamadan 1lt./da. dozunda çiçeklenme ve hasat döneminde uygulanabilir.
Narenciye	Çiçek döneminde, petal yaprakların dökümünde ve haziran dökümünden sonra yapraktan birer uygulama, 100-150cc./100lt.
Yapraklı Sebzeler, Süs Bitkileri, Çiçekler	Dikimden sonra, hasada kadar yapraktan 2-3 uygulama 100-150cc./100lt. su dozunda uygulanır. Damlamadan 1lt./da. dozunda çiçeklenme ve hasat döneminde uygulanabilir.

Kullanım dozları yapraktan veya damla sulama uygulaması ile dekar başına 100 lt suya göre hesaplanmıştır

ONYX, tamamen deniz yosunu ve hayvansal kaynaklı aminoasit içeren etkili bir üründür. özellikle petal yaprak dökümü döneminde uygulandığında, hücre bölünmesini hızlandırarak iri meyve alt yapısını oluşturur. meyvede kuru madde oranının artmasına, brix, renk ve raf ömrünün uzun olmasında etkin rol oynar.

- Hücre bölünmesini artırır.
- Sıcaklık ve benzeri stres koşullarında dökümü azaltır.

Karışılabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

TOTEM

SPECIAL SERIES

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NPK'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%35
Toplam Azot (N)	%5
Amonyum Azotu (N)	%1
Nitrat Azotu (N)	%4
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%23
Max Nem	%20
pH 4,5-6,5	

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Narenciye	Haziran dökümünden sonra 10 gün arayla yaprakdan 2-3 uygulama 200-250gr/100lt.
Sert Çekirdekli	Meyve büyüme döneminde yaprakdan 2-3 uygulama 200-250gr /100lt.
Bağ	Saçma koruk döneminden hasada kadar yaprakdan 2-3 uygulama 200-250gr/100lt.
Buğday, Soya, Hububatlar	Başak, tane ve bakla oluşum döneminde yaprakdan 2-3 uygulama 200-250gr/100lt.
Yer Fıstığı, Patates	Patates yumru büyüme ve fıstıkta iç doldurma dönemlerinde yaprakdan 2-3 uygulama 150-200gr/100lt.
Domates, Biber, Hıyar, Çilek, Patlıcan, Kavun, Karpuz	Meyve teşekkülünden itibaren hasada kadar yaprakdan 2-3 uygulama 200-250gr/100lt.

Yapraktan ve damlama sulama yöntemiyle uygulanabilir.

Damlamadan tüm bitkilerde 2-3 uygulama 1-1,5kg/da. dozunda uygulanır.

TOTEM içerisinde vitamin, protein ve amino asitler bulunmaktadır. İçerisindeki karışım tamamı organik komplekstir. Özellikle stres koşullarında antistres ürünü olarak görev yapar. Ürün büyüme döneminde ciddi irileşme ve meyvenin renk almasını sağlayan bir biostimulanttır.

- Meyve briks (şeker) miktarını artırır.
- Meyvenin olgunlaşmasını ve renk almasını sağlar.
- Meyvede kalite ayrıca raf ömrünü uzatır.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Alkalın ve triforin bazlı ürünlerle karıştırmayınız. Asla uygun doz önerilerini aşmayınız. Gerekli yerlerde kullanınız. Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Yaprak Uygulaması



EC FERTİLİZER NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

9-11-5

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



POLYWAY

SPECIAL SERIES

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%9
Nitrat Azotu (N)	%2
Amonyum Azotu (N)	%2,5
Üre Azotu (N)	%4,5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%11
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%5

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Narenciye	Çiçek döneminde, haziran dökümünden sonra, 100-150cc /100lt. dozunda
Elma, Armut	Çiçek başlangıcından itibaren 3-4 uygulama, 150cc-200cc/100lt.
Bağ	Çiçek ve ince koruk döneminde 2 uygulama, 250cc/ dekar
Patlıcan, Salatalık, Kabak	Çiçeklenme başlangıcından, meyve tutumu ve meyve büyüme dönemlerinden itibaren 4-5 uygulama 150-200cc /100lt.
Domates	Çiçeklenme dönemi ile birlikte ve meyve tutumu döneminde 150-200cc /100lt.
Çilek	Çiçek sapları çıkmaya başladığında ve çiçekten hemen önce 150-200cc/100 lt
İspanak, Yedikule, Marul	Soğuk stresinin yaşandığı 3-4 yapraklı döneminde 1-2 uygulama, 250cc /dekar

Yapraktan uygulama.

POLYWAY, bitkilerin özellikle çiçek, polen, meyve, çekirdek gibi bölümlerinin ve büyüme noktalarının gelişimini kontrol eden, bitki bünyesine hızla penetre olup iletim sistemine dahil olan ve hızla etki gösteren özel bir üründür. Genel olarak bitkilerde çiçek, dölleme ve kök gelişimi esnasında dış etkenler ile stres koşulları meydana gelir. Bu stres koşulları bitkilerde hayati fonksiyona sahip enzim ve hormon faaliyetlerini yavaşlatır. İşte bu gibi durumlarda POLYWAY yavaşlayan enzim ve hormon faaliyetlerinin daha hızlı, yeterli çalışmasını sağlayarak büyüme ve gelişmenin hızlı, hem de çiçek ve meyve gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar. Özellikle kiraz, narenciye, zeytin gibi meyve tutumunda hassas olan bitkilerde kullanılabilir.

- Meyve tutumunu artırır.
- Meyve sapını güçlendirir.
- Sebzeerde çiçek oluşumu ve maksimum tutum sağlar.
- Yan dal oluşturmaz.

POLYWAY vejetasyonunun aşırı gittiği dönemlerde ve bitkilerde kullanıldığında gelişmeyi generatif kısımlara yönlendirerek boylanmayı baskı altına alır. POLYWAY damlamadan kullanıldığında yeni kök oluşumunu ve köklerin işlevini artırır.

PROWAY 239

10-15-45

EC FERTİLİZER HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%10
Nitrat Azotu (N)	%8
Üre Azotu (N)	%2
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%45

Kullanım Şekli ve Dozu
Tüm bitkilerde yapraktan ihtiyaca göre 50-150gr /100lt. suya karıştırılarak uygulanır.
Meyve büyümesi ve olgunlaşmayı hızlandırmak istendiğinde uygulanır. Bitkilerde vejetatif büyümeyi yavaşlatıp generatif gelişmeye yönelendirebilmek için kullanılır.

Yapraktan uygulanır.

Proway 239 meyvenin büyümesi ve olgunlaşmasını hızlandırmak ve bitkinin vejetatif gelişimini yavaşlatarak generatif gelişmeye teşvik etmek için kullanılan özel bir karışımdır.

- Optimum çiçek açma
- Olumsuz çevre koşullarında bile meyve oluşumuna teşvik eder.
- Meyve boyutunu artırır.
- Ürünün kalitesini artırır.
(Şeker içeriği, renk, homojen meyve boyu, raf ömrü...)

Yaprak Uygulaması

VİTAMİN
ENZYME
PLANT
ACTIVATOR



EC FERTİLİZER HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ

PROWAY 312

27-9-18+TE

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%27
Nitrat Azotu (N)	%5
Amonyum Azotu (N)	%2
Üre Azotu (N)	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%9
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%18
Suda Çözünür Bor (B)	%0.05
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0.1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0.1
Mn, Zn EDTA Şelatlıdır.	

Bitki	Kullanım Şekli Dozu
Narenciye	Sürgün hareketinin başlamasıyla yapraktan 100-150gr /100lt.
Mısır	6-8 yapraklı dönemde yapraktan 100-150gr/da
Pamuk	Tarak oluşum döneminde yapraktan 100-150gr/da
Tütün, Ayçiçeği, Soya, Patates, Karpuz, Kavun, Yonca	Açık tarla ve örtü altında yetiştirilen bütün sebzelerde, Gelişim döneminde yapraktan 100-150gr /da veya 100lt.
Bağ	Salkım uzatma ve yan dal (Pançak) yaptırmak amaçlı yapraktan 100-150gr/100lt.

Yaprak Uygulaması

VİTAMİN
ENZYME
PLANT
ACTIVATOR



Proway 312 bitkileri her türlü stresten korumak, stresin neden olduğu sorunları gidermek, bitki gelişimini (vejetatif-generatif) hızlandırmak için hazırlanmış spesifik bir üründür. Kullanıldığı bitkilerde büyüme aktivitesini hızlandırır. Böylece bitkinin maruz kaldığı stresten çabuk kurtulmasını sağlar. Kullanıldığı doza ve NPK içeriğine göre bitkide yaptığı performanslar değişir. Proway 312 düşük dozlarda da kullanıldığında, bitkinin vejetatif gelişmesi, yüksek dozlarda kullanıldığında ise daha çok generatif gelişmesi hızlanır. Normal dozlarda kullanıldığında, hem vejetatif hem de generatif gelişmeyi teşvik eder. Özellikle çiçek tomurcuğunun çabuk gelişimini, oluşan tomurcukların aynı anda çiçek açmasını, açan çiçeklerin daha kolay döllenmesini sağlar ve oluşan meyvelerin dökülmesini önler. Yeni gelişen meyvede hücre bölünme hızını artırarak, meyvenin çabuk büyümesine etki eder.

- Sürgün gelişimini hızlandırır.
- Homojen çiçeklenmeye teşvik eder.

Proway 312 damlamaya uygulandığında, hem vücut köklerinin gelişimini hızlandırır, hem de bitkide yeni kök oluşumunu teşvik eder. EC (tuzlanma) yüksek olan yerlerde ikili, aşırı su tutan topraklarda, organik maddenin yetersiz olduğu yerlerde, siyah malçlama yapılan yerlerde kökler ya yüzeysel gelişir veya köklerde boğulmalar ve ölümler gerçekleşir. İşte Proway 312 köklerin yüzeysel büyümelerini engeller, daha derinlere doğru gelişimini teşvik eder. Böylece yukarıda belirtilen olumsuzluklardan köklerin uzaklaşmasını sağlar.



ADRESS

21-8-0

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%21
Amonyum Azotu (N)	%3
Üre Azotu (N)	%18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%7
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%8

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Sebzelerde	Fide dikimi ile beraber can suyu veya ilk sulamada köklenmeyi teşvik amacı ile 1kg/da bitkilerde meydana gelen kök hastalıkları ve zararlıların tedavisinden sonra yeni kök oluşumu için 1kg/da fide uygulamasında kök bölgesine uygulama 100gr /100lt. su
Tüm Meyve Fidanlarında	Fidan dikimi ile beraber can suyu veya ilk sulamadan itibaren 1 ay ara ile 2 uygulama 1kg/da fidan gelişimi, döneminde 1kg/da

EC FERTİLİZER HARMANLANMIŞ NP GÜBRESİ

Toprak Uygulaması



VİTAMİN

ENZYME

PLANT
ACTIVATOR



Adress şaşırtma dönemi veya hemen sonrasındaki bitki gelişiminin ilk evrelerinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Ürün ilk evrelerde bitkiyi beslemesinin yanında saçak kök yapısının gelişimi, uzaması, üzerindeki emici tüylerin oluşumu ve bu tüylerin sağlıklı kalması ile ilgili mücadele verir. Bitkilerin hızlı bir şekilde gelişimini sağlar.

- Saçak kök oluşumunu destekler.
- Emici tüy oranında artış sağlar.
- Sağlıklı kök yapısı oluşturur.

Karışabilirlik: Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Asla uygun doz önerilerini aşmayınız. Gerekli yerlerde kullanınız. Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER NPK'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Yaprak Uygulaması



VİTAMİN

ENZYME

PLANT
ACTIVATOR



Algaway fide - fidan döneminde verildiğinde fotosentez hızını artırır ve gerekli hammaddeyi karşılar. Bunun neticesinde bitkide yaprak gelişimi, çiçek ve meyve gelişimi, kök gelişimi hızlanır. Aynı zamanda gelişen bu kısımlar çevresel etkenlere karşı daha dayanıklı olurlar. Çiçekler oluşurken, döllenme organlarının ve polenlerin daha aktif ve sağlıklı olmasını sağlar. Böylece döllenme şansı ve döllenme meyvelerin oluşum hızı artar. Döllenmeden sonra, meyvenin ilk büyümesi esnasında verildiğinde, çok çabuk bir şekilde bitki bünyesine alındığı ve taşıdığı için, direk olarak meyve gelişimini hızlandırır. Aynı zamanda bu dönem meyvelerin renginin ve kalitesinin belirlendiği, şekillendiği dönemdir.

- Meyve kalitesini artırır.
- Meyve ve raf ömrünü artırır.
- Hububatlarda gluten miktarını artırır.
- Meyve briks (şeker) miktarını artırır.

Bu yüzden meyveyi direk olarak beslediği, renk pigmentlerinin düzenli olmasını sağladığı ve bu pigmentlere etki edecek dış etkenlere karşı bitkinin direncini arttırdığı için, ileride meyve renginde problem olmaz. Aynı zaman bu dönemde

ALGAWAY

7-6-21

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%20
Toplam Azot (N)	%7
Nitrat Azotu (N)	%5
Amonyum Azotu (N)	%2
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%21
Max Nem	%20
pH 3,5-5,5	

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Narenciye	Haziran dökümünden sonra 10'ar gün arayla yapraktan 2-3 uygulama 200-250gr /100lt.
Sert Çekirdekli, Elma, Armut	Meyve büyüme döneminde yapraktan 2-3 uygulama 200-250gr /100lt.
Bağ	Saçma koruk döneminden hasada kadar yapraktan 2-3 uygulama 200-250gr/100lt.
Buğday, Soya, Hububatlar	Saçma koruk döneminden hasada kadar yapraktan 2-3 uygulama 200-250gr /100lt.
Yer Fıstığı, Patates	Patates yumru büyüme ve fıstıkta iç doldurma dönemlerinde yapraktan 2-3 uygulama 200-250gr /100lt.
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Çilek, Kavun, Karpuz	Meyve teşekkülünden itibaren hasada kadar yapraktan 2-3 uygulama 200-250gr /100lt.

Yapraktan ve damlama sulama yöntemiyle uygulanabilir. Damlamadan tüm bitkilerde 2-3 uygulama 1-1,5 kg/da. Dozunda uygulanır.

meyveyi hızlı büyüttüğü ve hormonal denge için gerekli besini karşıladığından dolayı meyve kalitesinde de problem olmaz. Algaway topraktan köklere verildiğinde, toprağın biyolojik, kimyasal ve fizyolojik yapısını etkiler. Bitki kök miktarı çok az veya işlevsel olarak zayıf olsa bile, Algaway ile temasa geçtiğinde, içerisindeki bazı besinleri almaya başlar, kökün gelişimi ve işlevi artar. Böylece köklerin topraktan su ve besin alımı hızlanarak, bitki köklerinin hormon salgılaması artar. Bu işlevinden dolayı Algaway çok soğuk dönemlerde bile bitkinin ve köklerinin sağlıklı gelişimini sağlar. Algaway özel kalitedeki yosunlar stokinin (zeatin) içerir. Stokininler hücre bölünmesini hızlandırır, nükleik asitleri düzenler, sürgün uçlarını bastırır ve yan dallanmayı teşvik eder. Ayrıca gözleri uyarır, Filizlenmeyi artırır, besinlerin taşınmasını kolaylaştırır, meyvelerin ve yaprakların yaşlanmasını ve dökülmesini geciktirir. Algaway yüksek bir çözünürlüğe sahiptir, yapraktan çok kolay ve hızlı alınır. Özellikle çiçek ve meyve döneminde bitki gelişimini etkileyen beslenme yetersizliği ve dengesizliği, kötü toprak ve hava koşulları çiçeklenmeye, verime ve kalite düşüklüğüne sebep olur. Algaway hem bitkilerin bu koşullardan etkilenmesini önler, hem de normal biyolojik ve fizyolojik gelişimi hızlandırır.

MİKRO ELEMENT SERİSİ



- THOR
- KEY
- MICROLEX
- MICROWAY
- ZINWAY 10
- MANWAY 10
- PANDA
- BOROWAY
- FRESH
- BOROMOL
- BOROLIVA
- BORICALL

THOR

EC FERTİLİZER MANGAN (Mn-Sülfat) ve ÇİNKO (Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%5

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Narenciye, Meyve ağaçları	Vejetatif gelişme ve çiçeklenme döneminde, düzenli olarak, bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, yapraktan 200-250ml./100lt. dozunda uygulanır.
Bağ	Salkım uzatma ve yandal (Pançak) yaptırma döneminde, yapraktan 150-200ml./100lt. dozunda uygulanır.
Tarla bitkileri	Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, yapraktan 150-200ml./100lt. dozunda uygulanır.
Tüm sebzelerde	Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak bitkinin durumuna göre yapraktan 200-250ml./100lt. dozunda uygulanır.
Tarla bitkileri ve sebzelerde	Damlama ve yağmurlama sulama yolu ile bitkinin ve toprağın pozisyonuna göre 2-3lt./da. dozunda her dönemde uygulanabilir.
Bahçe bitkilerinde	Damlama sulama yolu ile bitkinin ve toprağın pozisyonuna göre 3-5lt./da. dozunda çiçeklenme ve meyve tutumu döneminde uygulanabilir.

Yapraktan veya damla sulama yöntemiyle uygulanabilir.

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



- Bitkide Çinko ve Mangan noksanlığını çok hızlı bir şekilde kapatır.
- Çiçeklenmeyi artırır.
- Bitki direncini yükseltir.
- Hasat sonu uygulamalar ile bir sonraki yılın meyve gözlerini oluşturur.

Thor, Çinko ve Mangan içeriği ile bitkide damlamadan uygulamalarda kök gelişimi ve fungal hastalıklara direnç göstermesinin yanında yaprak uygulamalarında çiçeklerin açması ve polen miktarlarının artması için fizyolojik oluşumları meydana getirir. Çiçek öncesi çinko açığını ciddi anlamda kapatıp Mangan desteği ile homojen ve sağlıklı çiçekleri oluşturur sezon sonu uygulamalarda peridyositeyi ciddi anlamda azaltır, içerisindeki bitki gelişim düzenleyiciler bitkideki direnci yükseltir.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

KEY SPECIAL SERIES

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%20

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Narenciye, Meyve ağaçları	Vejetatif gelişme ve çiçeklenme döneminde, olgunlaşma dönemine kadar düzenli olarak, bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre yapraktan 200-250cc/100lt. dozunda uygulanır. %6'lık solüsyon hazırlanıp fırça yardımıyla gövdeye sürülür.
Tarla bitkileri	Vejetatif gelişme döneminde devamında düzenli olarak, bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, yapraktan 200-250cc/ 100lt. dozunda uygulanır.
Tüm sebzeler	Vejetatif gelişme döneminde devamında düzenli olarak, bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, yapraktan 200-250cc/100lt. dozunda uygulanır.
Tarla bitkileri ve sebzelerde	Damlama ve yağmurlama sulama yolu ile bitkinin ve toprağın pozisyonuna göre 2-3lt./da. dozunda her dönemde uygulanabilir.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



KEY bitkilerde çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve büyümesinde kullanılan sistemik bir üründür. Toprakdan ve yapraktan güvenle kullanılabilir. İçeriğindeki özel bitki gelişim düzenleyiciler bitkinin direnç mekanizmasını uyarır. Ayrıca bitkilerde boğum arasını kısaltarak, daha fazla sağlıklı çiçek oluşturur. Bu sayede meyve tutumu önemli ölçüde artar. Sezon sonu bitkideki kullanılan fosfor ve potasyumu kış döneminde tekrardan depolayıp bir sonraki sezonun meyve gözlerini oluşturmaya yardımcı olur

- Çiçeklenmeyi artırır.
- Bitki direncini yükseltir.
- Hasat sonu uygulamalar ile bir sonraki yılın meyve gözlerini oluşturur.
- Meyve büyüme dönemi hızlı bir şekilde boy yaptırır.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.



MICROLEX

10-5-5+3,5 MgO+TE

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%10
Nitrat Azotu (N)	%1,5
Amonyum Azotu (N)	%1
Üre Azotu (N)	%7,5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%3,5
Suda Çözünür Bor (B)	%0,1
Suda Çözünür Demir (Fe)	%3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%6

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Narenciye, Meyve ağaçları	Vejetatif gelişme döneminde düzenli olarak bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, yapraktan 200-400gr./100lt. dozunda uygulanır.
Tarla bitkileri	Vejetatif gelişme döneminde düzenli olarak bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, yapraktan 100-200gr./100lt. dozunda uygulanır.
Tüm sebzeler	Vejetatif gelişme döneminde düzenli olarak bitkinin durumuna göre, yapraktan 100-200gr./100lt. dozunda uygulanır. Damlama sulama ile dekara 400-500gr. tavsiye edilir.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Microlex, bitkiler de magnezyum ve iz element noksanlıklarını çok çabuk şekilde gideren, EDTA ile şelatlanmış, ani etkili iz element kompleksidir. Bileşimindeki düşük biüretli üre ve magnezyum sayesinde bitkide hücre büyümesi, klorofilin oluşması için gerekli elementlerden mangan, çinko, demir verilmiş olur.

EC FERTİLİZER HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



ENZYME

VİTAMİN



Karışabilirlik;
Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir. Ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Ayrıca kullanım konusunda teknik uzmanlarımıza danışınız.

EC FERTİLİZER BOR(B),BAKIR(Cu-Sülfat),DEMİR(Fe-Sülfat), MANGAN(Mn-Sülfat),MOLİBDEN(Mo),ÇİNKO(Zn-Sülfat) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



ENZYME

VİTAMİN



Microway, bitkilerde magnezyum ve iz element noksanlıklarını çok çabuk şekilde gideren iz element kompleksidir. Bileşimindeki biüretli üre ve magnezyum sayesinde bitkide hücre oluşumu ve gelişimi için gerekli besin transferi sağlanmış olur. Düşük biüretli üre ile hücre büyümesini aktive eder. Klorofil oluşması için gerekli temel elementlerden biri olan magnezyum bitkinin hormon ve enzim salgılamasında gerekli oynar.

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	%0,5
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	%3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%6
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%7

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Narenciye, Meyve Ağaçları, Bağ	Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak, bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, yapraktan 200-400gr. / 100lt. dozunda uygulanır.
Tarla Bitkileri	Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak, bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, yapraktan 100-200gr. / 100lt. dozunda uygulanır. Aynı miktar dekar uygulaması içinde geçerlidir.
Tüm Sebzelerde	Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak, bitkinin durumuna göre, yapraktan 100-200gr. / 100lt. dozunda uygulanır. Damlama sulama ile dekara 400-500gr. tavsiye edilir.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Karışabilirlik;
Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir. Ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Ayrıca kullanım konusunda teknik uzmanlarımıza danışınız.

ZINWAY 10

EC FERTILIZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%10

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Yapraktan tedavi edici uygulama	Noksanlık görüldüğünde 7-10 gün arayla 150-200cc./100lt. su dozunda 2-3 uygulama.
Yapraktan önleyici uygulama	100-150 cc./100 litre su dozunda 2 uygulama.
Damla sulama ile uygulama	Uygulama sayısı ihtiyaca göre belirlenerek 100 lt. su ile 1-1,5 lt/da. dozunda uygulanır.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



ENZYME

PLANT
ACTIVATOR



Zinway 10, yüksek oranda çinko içeren sıvı bir ürün olup, yapraktan ve damla sulama ile uygulanabilir. Sert sularda bile ürün stabil kalır. Yaprak ve köklerin dokusundan penetrasyonu çok iyi olup kolayca bitki bünyesine girer. Zinway 10 bitki bünyesinde indolasetik asit sentezi için gereken triptofan isimli aminoasit üretimini destekler ve böylece bitki için regülatör görevi görür. Zinway 10 vejetatif gelişim dönemiyle üretim dönemi arasındaki dengeyi garantiler ve böylece verim artışı sağlar.

Karışabilirlik;

Bu ürün bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçlarıyla karışabilir. Ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Ayrıca kullanım konusunda teknik uzmanlarımıza danışınız. Asla uygun doz önerilerini aşmayınız. Gerekli yerlerde kullanınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

EC FERTILIZER
MANGANLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(MANGAN SÜLFAT İÇERİKLİ)

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



ENZYME

PLANT
ACTIVATOR



Manway 10, yüksek oranda Mangan içeren sıvı bir ürün olup, yapraktan ve damla sulama ile uygulanabilir. Suda ve toprakta başka elementlerle bağlanmaz. Dolayısıyla kolayca bitki tarafından alınabilir. Klorofil ve vitamin C sentezinde katalizör görevi görür. Manway 10 yaprak ve köklerin dokusundan penetrasyonu çok iyi olup kolayca bitki bünyesine girer. Manway 10 mangan eksikliğinden kaynaklanabilecek olumsuzlukları engeller ve bitki bünyesinde şeker oluşumunu hızlandırır.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Asla uygun doz önerilerini aşmayınız. Gerekli yerlerde kullanınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

MANWAY 10

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%10

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Tüm Bahçe Bitkilerinde	Yapraktan, ihtiyaca göre 100lt. suya 100-200cc. arası uygulanır.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.



PANDA

EC FERTİLİZER ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%20

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır vb.)	Kardeşlenme sonrası 100-150 mL/100 lt.
Endüstri Bitkileri (Patates, Şeker Pancarı, Pamuk, Ayçiçeği, Kanola, vb.)	Bitkiler 4-6 yapraklı dönemdeyken 100-150 mL/100lt.
Turuncgiller, Bağ, Zeytin	Çiçeklenme öncesi, sonrasında ve hasat sonrasında olmak üzere üç uygulama 150-200mL/100lt.
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında	Çiçeklenme öncesi, sonrası ve hasat sonrası olmak üzere toplam 3 uygulama 150-200mL/100lt.
Domates, Biber, Patlıcan (Açık ve Örtü Altı)	Çiçeklenme öncesi ve sonrasında 2 uygulama 100-150mL/100lt.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Panda, Çinko solüsyonudur. Çinko içeriği yoğun ve özel bir üründür. Çinko noksanlığı görülen bitkilerde, düzenli kullanımıyla vejetatif ve generatif gelişmeyi artırır, sağlıklı bitki gelişimi ve yüksek verim sağlar. Tarla ve bahçelerde, düzenli uygulamalar yapılarak muhtemel çinko noksanlığı önlenir. Kesinlikle çinko eksikliğine karşı tedavi edici özelliği vardır, düşük dozlarda bile eksiklikleri giderir.

Karışılabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Ayrıca kullanım konusunda teknik uzmanlarımıza danışınız.

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



EC FERTİLİZER BORON ETANOL AMİN

BOROWAY

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	%10

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Narenciye, Zeytin, Meyve Ağaçları	Hasattan sonra ve çiçek döneminden önce ayrıca bor noksanlığı görüldüğü durumlarda, 100cc.-150cc./100lt. dozunda.
Bağ, Çilek, Tüm Sebzeler	Çiçeklenme döneminden önce ayrıca bor noksanlığı görüldüğü durumlarda, 100cc.-150cc./100lt. dozunda.
Çiçek ve Süs Bitkileri	Bor noksanlığı görüldüğü durumlarda 100cc.-150cc./100lt. dozunda.
Tahıllar, Endüstri Bitkileri, Şeker Pancarı	7-8 yapraklı dönemden itibaren, dikim sıra araları kapanana kadar dekara 300cc. dozunda 1-2 uygulama yapılabilir. Aynı dönemlerde de bor noksanlığı görülen durumlarda damlamadan dekara 300-500cc. dozunda uygulama yapılabilir.

Yapraktan uygulanabilir.



Boroway, sıvı formülasyon olarak yüksek oranda bor içeren, boretanolamin ile komplekslenmiş sıvı bir gübredir. Bu komplekslenme sayesinde bor elementi bitki ve yapraklar tarafından daha iyi bir şekilde alınır. Aynı zamanda içerdiği komplekslenme maddesi kuvvetli bir taşıyıcı görevi üstlenir. Boroway ile çiçeklenme, polenleşme ve sonuçta da dölleme çok daha iyi olur. Meyvelerdeki şeker oranı yüksek olur. Bor noksanlığına karşı kullanıldığında tüm bitkilerde iyi sonuçlar verir.

- Bitki bünyesinde oldukça hareketlidir.
- Polen oluşumunun bitkide devamlılığını sağlar.
- Çiçek oluşumu ve Meyve tutumunda etkilidir.
- Bitki hücre bölünmesini artırır.

Karışılabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir. Ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önemlidir. Alkalın ve triforin bazlı ürünlerle karıştırmayınız.

FRESH

EC FERTİLİZER MANGANLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%15

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır vb.)	Kardeşlenme sonrası 100-150 mL/100 lt.
Endüstri Bitkileri (Patates, Şeker Pancarı, Pamuk, Ayçiçeği, Kanola, vb.)	Bitkiler 4-6 yapraklı dönemdeyken 100-150 mL/100lt.
Turuncgiller, Bağ, Zeytin	Çiçeklenme öncesi, sonrasında ve hasat sonrasında olmak üzere üç uygulama 150-200mL/100lt.
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında	Çiçeklenme öncesi, sonrası ve hasat sonrası olmak üzere toplam 3 uygulama 150-200mL/100lt.
Domates, Biber, Patlıcan (Açık ve Örtü Altı)	Çiçeklenme öncesi ve sonrasında 2 uygulama 100-150mL/100lt.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Fresh, yüksek kalite hammaddelerden üretilmiş bir üründür. Fresh suda çözünmüş olarak yapraktan etkin bir şekilde alınır. Özellikle, mangan gereksinimi yüksek kültür bitkilerinde önerilen bir süspansiyon formülasyonudur. Koruyucu uygulamalar için düşük doz, hafif noksanlık belirtilerinde ise daha yüksek dozlar tercih edilmelidir. Süspansiyon yapıda olmasından dolayı oldukça yoğun bir üründür. Kesinlikle mangan eksikliğine karşı tedavi edici özelliği vardır, düşük dozlarda bile eksiklikleri giderir.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Ayrıca kullanım konusunda teknik uzmanlarımıza danışınız.

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



EC FERTİLİZER BOR (B) ve MOLİBDEN (Mo) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



- Çiçeklenmeye teşvik eder.
- Bitkiler tarafından hızlı alınır.
- Fitotoksik değildir.

Boromol, sıvı formülasyon olarak yüksek oranda bor içeren, bor etanol amin ile komplekslenmiş sıvı bir gübredir. Bu komplekslenme sayesinde bor elementi bitki ve yapraklar tarafından daha iyi bir şekilde alınır. Aynı zaman da içerdiği kompleksleme maddesi kuvvetli bir taşıyıcı görevi üstlenir. Boromol ile çiçeklenme, polenleşme ve sonuçta da dölleme çok daha iyi olur. Meyvelerdeki şeker oranı yüksek olur. Bor noksanlığına karşı kullanıldığında tüm bitkilerde iyi sonuçlar verir. Bazı bitkilerin molibden ihtiyaçları nispeten daha yüksektir. Her şeyden önce, dikotiledon bitkilerin molibden gereksinimleri monokotiledonlara göre daha yüksektir.

BOROMOL

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	%8
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%2

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Narenciye, Meyve ağaçları	Çiçeklenme öncesinde 0,2lt./da dozunda uygulanmalıdır. Aynı zamanda hasattan sonra yaprak yaşlanmasından önce 0,2-0,3lt./da dozunda uygulanmalıdır. Su oranı 20lt./da
Fasulye, Bezelye	5 ile 15cm'lik döneminde 0,2-0,3lt./da dozunda uygulanmalıdır. Eğer gerekirse 10-14 gün aralığında tekrarlanmalıdır. Su oranı 20lt./da
Narenciye	İlk baharda 2 ve 3 yeni yaprak gelişiminden sonra 0,2-0,3lt./da dozunda uygulanmalıdır. Aynı zamanda sonbahar süresince de uygulanır. Su oranı 50lt./da
Pamuk	İlk çiçek tomurcuğu görüldüğünde ve yine 4-6 yaprak döneminde 0,1-0,2lt./da dozunda uygulanmalıdır. Su oranı 20lt./da
Bağ	Çiçeklenme öncesinde 0,2-0,3lt./da dozunda uygulanmalıdır. Eğer gerekli olursa meyve oluşumunda tekrarlanmalıdır. Su oranı 20lt./da
Kavun	(Tarlada Yetiştirilen) Çiçeklenme başlangıcında, çiçeklenme sonunda ve 4 yapraklı dönemde 0,2-0,3lt./da dozunda uygulanmalıdır.
Zeytin	İlk baharda çiçeklenme öncesinde 0,2-0,3lt./da dozunda uygulanmalıdır. Su oranı 40 ile 100lt./da
Çilek	(Tarlada Yetiştirilen) Yeşil tomurcuk ve 10-14 gün sonra ki dönemde 0,1lt./da dozunda uygulanmalıdır. Aynı zamanda hasat sonrası yeni gelişim döneminde 0,2lt./da dozunda uygulanmalıdır. Su oranı 20lt./da
Ayçiçeği	2 ile 8 çift yaprak döneminde 0,2-0,3lt./da dozunda uygulanmalıdır. Su oranı 3-20lt./da
Domates	(Tarlada Yetiştirilen) Ürün 15 cm uzunluğunda (4 ile 6 yapraklı döneminde) olduğu zaman 0,2-0,3lt./da dozunda uygulanmalıdır. Eğer gerekirse 10-14 gün aralığında tekrarlanmalıdır. Su oranı 20lt./da.
Karpuz	(Tarlada Yetişen) Çiçeklenme başlangıcında, çiçeklenme sonunda ve 4 yapraklı dönemde 0,2-0,3lt./da dozunda uygulanmalıdır.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Karışabilirlik;

Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçlarıyla karışabilir. Ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Ayrıca kullanım konusunda teknik uzmanlarımıza danışınız.

BOROLIVA

14-12-6+TE

EC FERTİLİZER
HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%14
Nitrat Azotu (N)	%2
Amonyum Azotu (N)	%2
Üre Azotu (N)	%10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%6
Suda Çözünür Bor (B)	%8

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Meyve Ağaçları, Narenciye, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve çiçek döneminde 100lt. suya 100-150gr. dozunda.
Pamuk	4-6 yaprak döneminde ve çiçeklenme başlangıcında dekara 100-150gr. dozunda.
Ayçiçeği	4-8 yaprak döneminde dekara 100-150gr. dozunda.
Fasulye, Soya, Yerbistisi	5-15cm'lik dönemde 10-15 gün arayla 2 uygulama dekara 100-150gr dozunda.
Şeker Pancarı, Mısır	6-8 yaprak döneminde dekara 100-150gr. dozunda, şeker pancarında sıra örtülünceye kadar 2 uygulama yapılmalıdır.
Çilek ve Tüm Sebzelerde	Çiçeklenme öncesi, çiçek dönemi ve yeni gelişme döneminde dekara 100-150gr./100lt dozunda.
Kavun, Karpuz (Tarla)	Çiçeklenme başlangıcı ve çiçek döneminde dekara 100-150gr.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Boroliva, özellikle zeytin ağaçları için geliştirdiğimiz spesifik bir üründür. Glisinbetain aktivatörlü olup besin maddelerini harekete geçirerek daha kolay alınmasını sağlar. Zeytin ağaçlarında çiçeklenmeyi ve döllenmeyi iyileştirir. Bor sayesinde polenler daha üretken olur, döllenmiş meyvelerin sayısını artırır. Ayrıca verimi ve yağ miktarını yükseltir.

Karışılabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir. Ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Ayrıca kullanım konusunda teknik uzmanlarımıza danışınız.



EC FERTİLİZER
ÇÖZELTİDE BORATLI GÜBRE
BORON ETANOLAMİN İÇERİKLİ

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



PLANT
ACTIVATOR



BORICALL

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	%2

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Meyve Ağaçları	Çiçekten önce, döllenmeden sonra ve meyve büyüme döneminde 100lt. suya 400-500cc.
Süs Bitkileri ve Çiçekler	Büyüme döneminden itibaren çiçek açana kadar 100lt. suya 300-350cc.
Bahçe Bitkileri	Çiçekten önce ve meyve büyüme döneminde 100lt. suya 350-400gr. Yapraklı sebzelerde büyüme döneminde 100lt. suya 350cc.
Sanayi Bitkileri (Şeker Pancarı)	7.-8. yapraktan sıra örtülünceye kadar 100lt. suya 350-400cc.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

BORICALL, özel kompleksi sayesinde sıvı formülasyon olarak bor elementlerini aynı solüsyonda içeren bir formülasyona sahiptir. BORICALL bitki dokusunun daha dayanıklı olmasını sağlar. Çevresel etkenlerden kaynaklanan stres durumlarında bitkiyi rahatlatır. Polenlerin daha etkin olmasını sağlayarak döllenmenin performansını artırır. Meyve iriliğini ve şeker oranını artırır.



YAPRAK GÜBRE SERİSİ



- BIO WAY PLUS
- SUN BLOCKER
- ASIST 3-5-55+TE
- ASIST 20-20-20+TE
- ARISTO
- COPPER PLUS
- MAXALGA
- ALEX
- GREENER
- CALWAY PLUS
- CALWAY
- NUTRI GROW PZn
- PROWAY CU FOLIAR
- PROWAY CU
- VOLANS
- CRATER

BIO WAY PLUS

ANIMAL ORIGININ

HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Organik Madde	%40
Organik Karbon (C)	%18
Organik Azot (N)	%7
Serbest Amino Asit Miktarı	%12
pH Aralığı 5,5 - 7,5	

Kullanım Şekli ve Dozu
Bütün bitkilerde yapraktan her dönemde 100cc-150cc / 100lt. dozunda uygulanabilir. Yine tüm bitkilerde damlama ve yağmurlama sulama yolu ile bitkinin ve toprağın pozisyonuna göre 1-2lt. /da dozunda her dönemde uygulanabilir.

Yapraktan veya damla sulama yöntemiyle uygulanabilir.

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması

ANIMAL
ORIGININ

PROTEIN

ENZYME

PLANT
ACTIVATOR



BIO WAY PLUS, damla sulama ve yapraktan uygulanmak için özel olarak geliştirilmiş düşük molekül ağırlıklı aminoasit ve peptid bazında organik azot içeren özel bir üründür. Kesinlikle ağır metaller içermez. Bio Way Plus yüksek bir çözünürlüğe sahiptir, dolayısıyla kökler ve yapraklar tarafından kolayca alınabilir. Tüm bitkiler için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır.

- Moleküler ağırlığı hafif olduğundan çok hızlı bir şekilde taşınma sağlanır.
- Beraber kullanıldığı makro, mikro ve ilaçların taşınması ve etkinliğini artırır.
- Her türlü stres koşullarında kullanılabilir.
- Anti stres ürünüdür.

Tüm çevresel, iklimsel ve fizyolojik stres koşullarında yapraktan yapılan uygulama sonucunda bu stres koşullarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Topraktaki mikroflorayı harekete geçirir. Köklenmeyi teşvik eder. Düzenli kullandığında topraktaki tuzluluğu giderir. Bitkinin olumsuz toprak koşullarından dolayı almakta zorlandığı besin maddelerinin ve elementlerin bitki bünyesine alınmasına yardımcı olur. Kötü hava şartlardan ve beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan streslere karşı bitkiyi korur. Gübrelerle birlikte verildiğinde gübrelemenin etkinliğini ve topraktan taşınımını artırır. Vejetasyonu teşvik eder. Organik tarımda kullanılır.

EC FERTİLİZER MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Yaprak Uygulaması



PLANT
ACTIVATOR



Sun Blocker kozmetik bir fonksiyona sahiptir. Bu özelliğinden dolayı daha kaliteli, albenisi yüksek, pazarlama kolaylığı olan ürünler elde edilebilir. Sun Blocker meyve yüzeyini şeffaf bir film tabakası ile kaplayarak güneşin zararlı ve yakıcı etkisine karşı koruma sağlar. Ayrıca içeriğinde bulunan iz elementler sayesinde beslenme özelliği olan özel bir karışımdır. Özellikle narenciye, elma armut ve nar için geliştirilmiş spesifik bir ürün olup, meyvelerin kabuklarında, genellikle aşırı nemden ve aşırı güneşten meydana gelen lekelenmeleri önler. Meyvede oluşabilecek pası engellemede aktif rol oynar.

- Bitkide su kaybını önler
- Raf ömrünü uzatır
- Kuraklığa karşı direnç sağlar
- Kabuk kalitesi ve renk sağlar

Karışılabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

SUN BLOCKER

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor	%4
Suda Çözünür Mangan	%0,5
Suda Çözünür Çinko	%0,5

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Narenciye, Nar	Sıcaklığın yüksek olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında 10-15 gün arayla 500 gr/100lt. su dozunda 2 uygulama
Elma	Pas mücadelesi kapsamında çiçeklenme periyodu ile başlayarak 10-15 gün arayla 250 gr/100 lt. su dozunda 3 uygulama Güneş yanıklığı ile mücadelesi kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında, yüksek sıcaklık ve nemin olduğu dönemlerde 15 gün arayla 500 gr/100lt.su dozunda 2 uygulama
Armut	Haziran sonu ile birlikte temmuz aylarında yüksek sıcaklık ve nemin olduğu dönemlerde 10-15 gün arayla 250 gr/100lt. su dozunda 2 uygulama
Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği	Havalandırma pencerelerine yakın direk güneş ışığına maruz kalan bitkilerde güneş ışığının zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için 250gr /100 lt. su dozunda
Açık Tarla Sebze Yetiştiriciliği	Temmuz ve Ağustos aylarında , yüksek sıcaklık ve nemin olduğu dönemlerde 10-15 gün arayla 250 gr/100lt. su dozunda 2 uygulama
Bağ	Ağustos aylarında , yüksek sıcaklık ve nemin olduğu dönemlerde 10-15 gün arayla 250 gr/100lt. su dozunda 2 uygulama



ASIST

3-5-55+TE

EC FERTİLİZER HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%3
Nitrat Azotu (N)	%3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	%55
Suda Çözünür Bor (B)	%0.01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0.01
Suda Çözünür Demir (Fe)	%0.02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0.01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0.002
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0.01
Cu, Fe, Mn, Zn EDTA Şelatlıdır.	

Kullanım Şekli ve Dozu
Tüm bitkilerde yapraktan, bitkinin fenolojik dönemleri de dikkate alınarak 150-250gr./100lt. dozunda 2-3 uygulama. Aşırı iz element noksanlığında 6-8 uygulama yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza danışınız.

Asist 3-5-55+TE, %100 suda çözülür. İz element içeren vasıflı toz yaprak gübresidir. Yapraklardan kolayca ve hızlı alınır. Bitkinin değişik fenolojik dönemlerine göre potasyum ağırlıklı dengeli bir yaprak gübresi olarak kullanılır.



Karışabilirlik;
Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

EC FERTİLİZER HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ



Asist 20-20-20+TE, %100 suda çözülür. İz element içeren vasıflı toz yaprak gübresidir. Yapraklardan kolayca ve hızlı alınır. Bitkinin değişik fenolojik dönemlerine göre azot, fosfor potasyum ağırlıklı dengeli bir yaprak gübresi olarak kullanılır.

ASIST

20-20-20+TE

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%20
Nitrat Azotu (N)	%5,6
Amonyum Azotu (N)	%4,4
Üre Azotu (N)	%10
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	%20
Suda Çözünür Bor (B)	%0.02
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0.01
Suda Çözünür Demir (Fe)	%0.02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0.01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0.007
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0.01
Stabil pH Aralığı 3-13	
Cu, Fe, Mn, Zn EDTA Şelatlıdır.	

Kullanım Dozları ve Zamanı
Tüm bitkilerde yapraktan bitkinin fenolojik dönemleride dikkate alınarak 200-250 gr/100 lt dozunda 2-3 uygulama. Aşırı iz element noksanlığında 6-8 uygulama yapılabilir.

Karışabilirlik;
Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir. Ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Asla uygun doz önerilerini aşmayınız. Gerekli yerlerde kullanınız. Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

ARISTO

ORGANİK KAYNAKLI SIVI DENİZ YOSUNU

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%21
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%4
Alginik Asit	%1
Maximum EC	12dS/m
pH Aralığı 8-10	

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Narenciye ve Diğer Meyve Ağaçlarında	Çiçeklenme döneminde ve meyve tutumu döneminden sonra 2-3 uygulama 150-200ml/ 100lt. suya
Buğday, Arpa, Çeltik	Kardeşleme döneminde ve çiçeklenme öncesinde birer uygulama 100-150ml / dekara
Üzüm	Daneler 5-10mm olduğu dönemde 2-3 uygulama 100-150ml /100lt. suya
Mısır, Ayçiçeği, Pamuk, Soya, Verfistiği, Patates	Bitkiler 3-5 yaprak olduğu dönemden itibaren 2-3 uygulama 100-150ml / dekara
Açık ve Örtü Altı Sebzelerde	Meyve gelişim döneminde 2-3 uygulama 100-150ml / dekara
Lahana, Kanabakar, Brokoli	Dikimden sonra bitki gelişmeye başladığı dönemden itibaren 2-3 uygulama 100-150ml / dekara

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



- Her türlü stres koşullarında kullanılabilir.
- Anti stres ürünüdür.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

- Moleküler ağırlığı hafif olduğundan çok hızlı bir şekilde taşınma sağlanır.
- Beraber kullanıldığı makro, mikro ve ilaçların taşınması ve etkinliğini artırır.

EC FERTİLİZER BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)

Yaprak Uygulaması Toprak Uygulaması



COPPER PLUS

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%4

Kullanım Şekli ve Dozu

Tüm bitkilerde yapraktan ihtiyaca göre 100lt. suya 200-350ml arası uygulanır.

Yapraktan veya damla sulama yöntemiyle uygulanabilir.

Copper Plus, Copper Plus hastalıklara karşı bitkiyi korurken bitkinin bakır ihtiyacını da giderir. Bakır klorofil oluşumunu teşvik ederek, bitkinin fotosentez hızını da arttırmaktadır. Bakır eksikliğinde bitkide fotosentez faaliyeti yavaşlamakta ve buna bağlı tüm fizyoloji olumsuz etkilenmektedir.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

MAXALGA

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER SIVI DENİZ YOSUNU

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%1
Alginik Asit	%0,7
Max EC	5 dS/m
Ph	7-9

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Tüm Sebzelerde	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında olmak üzere 7-10 gün arayla 4-5 uygulama. 150-200ml / da
Tüm Meyve Ağaçlarında	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama taç yapraklar düştükten sonra, ikinci uygulama meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır. 200-250ml / 100lt.
Bağ, Çilek, Muz	Çiçeklenmeden itibaren 7-10 gün arayla 4-5 uygulama. 150-200ml / 100lt Tüm endüstri bitkilerinde: İlk uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3-4 uygulama. 150-200 ml / da
Hububat	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde 2 uygulama. 150-200ml / da

Damla sulama ile uygulanır.

 Yaprak Uygulaması



HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

 Yaprak Uygulaması  Toprak Uygulaması



ALEX

ANIMAL ORIGININ

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%25
Organik Karbon (C)	%10
Organik Azot (N)	%3
Serbest Amino Asit Miktarı	%8
pH Aralığı: 8-10	

Kullanım Dozları ve Zamanı

Bütün bitkilerde yapraktan her dönemde 100-150ml /100lt. dozunda uygulanabilir. Yine tüm bitkilerde damlama ve yağmurlama sulama yolu ile bitkinin ve toprağın pozisyonuna göre 1-2lt. /da dozunda her dönemde uygulanabilir.

Yapraktan veya damla sulama yöntemiyle uygulanabilir.

Alex, tüm çevresel, iklimsel ve fizyolojik stres koşullarında yapraktan yapılan uygulama sonucunda bu stres koşullarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Topraktaki mikroflorayı harekete geçirir. Köklenmeyi teşvik eder. Düzenli kullandığında topraktaki tuzluluğu giderir. Bitkinin olumsuz toprak koşullarından dolayı almakta zorlandığı besin maddelerinin ve elementlerin bitki bünyesine alınmasına yardımcı olur. Kötü hava şartlardan ve beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan streslere karşı bitkiyi korur. Gübreler- le birlikte verildiğinde gübrelemenin etkinliğini artırarak ve topraktan taşınımını artırır. Vejetasyonu teşvik eder. Organik tarımda kullanılır.



GREENER

EC FERTİLİZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

EC FERTİLİZER KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

CALWAY PLUS

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%18
Üre Azotu (N)	%18
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%5

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Bağ	Çiçeklenme öncesi birinci uygulama ve hasat sonrası erken sonbaharda (yapraklar dökülmeden) ikinci uygulama yapılır 200-300cc /100lt.-da 2-3lt./da (Damlama)
Pamuk	Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk ilaçlamayla birlikte birinci uygulama, tarak oluşumunda ikinci uygulama yapılır. 100-300cc/100lt.-da 1-2lt./da (Damlama)
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyu 10-15 cm olunca birinci uygulama yapılır. 100-300cc/100lt.-da 1-2 lt./da (Damlama)
Buğday, Çeltik	Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır. 100-300cc/100lt.-da (Damlama)
Ceviz, Narenciye, Elma, Erik, Kiraz, Ayva, Fındık, Antepfıstığı	Gözler patladığında ve çiçeklenme bittiğinde uygulanır. En önemli uygulama zamanı ise meyve toplandıktan sonra (yaprakla henüz düşmeden) yapılmalıdır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde kalsiyum birikimine ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar.200-300cc/100lt.-da 2-3lt./da (Damlama)
Domates, Hıyar, Biber, Kabak	Çiçekten önce birinci uygulama yapılır. Daha sonra çinko eksikliği görüldüğünde dönemlerde ikinci ve üçüncü uygulama yapılır.200-300cc/100lt.-da 2-3lt./da (Damlama)
Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya	Bitki boyu 10-15 cm olunca birinci uygulama yapılır. 100-300 cc/100lt.-da1-2lt./da (Damlama)
Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak	4-6 yapraklı dönemde ilk uygulama, daha sonra çinko eksikliği görüldüğünde ikinci ve 3.üçüncü uygulama yapılır. 200-300 cc/100lt.-da 2-3lt./da (Damlama)
Havuç, Turp, Marul, Ispanak, Lahana	Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama, daha sonra çinko eksikliği görüldüğü taktirde 2. ve 3. uygulama yapılır. 200-300 cc/100lt.-da2-3 lt./da (Damlama)
Kavun, Karpuz	Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama yapılır. 200-300cc/100lt.-da 2-3 lt/da (Damlama).

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.



Greener, yapraktan uygulandığında, yaprak kutikulası tarafından emilir ve burada rezerv olur. Azot bu mumsu tabakadan düzenli ve istikrarlı bir şekilde salınır ve açılan stomalardan bitki ihtiyacı doğrultusunda alınır. Aynı zamanda erken dönem kullanımlarda çinko takviyesi ile bitkilerde görülen çinko noksanlığını özel formülasyonu sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde çözer. Hücre gelişimindeki fonksiyonel etkisi nedeniyle, yeni oluşan yaprak ve çiçek gözlerinin gelişmesini, döllenmiş çiçeklerin meyveye dönüşmesini, köklerin uzamasını ve gelişmesini sağlar.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.



Calway Plus, Kalsiyum ve molibden içeren, bitkiler tarafından çok çabuk ve tamamen alınabilen, bitki bünyesinde taşınabilen özel bir karışımdır. İçerdiği elementler hem yapraklar hem kökler tarafından çok çabuk bitki bünyesine alınır ve bitki içerisinde hızlı bir şekilde taşınır.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%12
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%5
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,005

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Narenciye	Çiçeklenme döneminde, meyve nohut iriliğine geldiğinde, haziran dökümünden sonra, meyve büyüme döneminde yapraktan birer uygulama, 250-300cc /100lt. dozunda.
Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Nektarin, Şeftali	Petal yaprakların dökülmesinden meyve büyüme kadar geçen sürede yapraktan 3-4 uygulama, 300-400cc /100lt.
Bağ	Meyve bağlamadan sonra renk dönüşümü süresince yapraktan 4-5 uygulama, 250cc /100lt.
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kabak	Döllenmeden sonra meyve teşekkülünden itibaren yapraktan 2-3 uygulama 250-300cc /100lt.
Kavun, Karpuz	Çiçeklenmeden itibaren hasada kadar yapraktan 2-3 uygulama 300 cc/100 lt.
Çilek	Döllenmeden sonra 8-10 gün arayla yapraktan 2-3 uygulama 250-500cc /100lt.
Yaprığı Yenen Sebzeler	Dikimden sonra hasada kadar yapraktan 2-3 uygulama, 250cc /100lt.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Calway Plus bitki tarafından bünyesine alındığında serum etkisi yaparak bitkinin iletim sistemlerinde besin ve suyun akışını da hızlandırır. Dolayısıyla bitkide meydana gelen sıcaklık, su ve beslenme yetersizliğinden kaynaklanan stresler minimuma iner. Özellikle sıcak dönemlerde yetiştirilen bitkilerde kalsiyum noksanlığında sıcaklığın direkt etkisi ya da su ve nem stresi dolayısıyla çiçek ve meyve dökülmeleri, salkım kurumaları, meyve renginde açılmalar, bitki genelinde solgunlaşmalar, çatlamlar vs. meydana gelir. Ayrıca direkt olarak sulamadan, toprak yapısından ve EC yüksekliğinden kaynaklanan stresler de kalsiyum noksanlığında oluşur. Özellikle cam seralar da patlıcan, domates ve hıyar gibi bitkilerde nem yetersizliğinden veya dengesizliğinden renk açılmaları , sulama yetersizliğinden veya diğer sebeplerden dolayı magnezyum ve kalsiyum noksanlığı görülür. İşte Calway Plus bu noksanlıkları ve arazları giderir. Calway Plus tüm meyvelerde ve bitki yapraklarında canlılık ve parlaklık sağlar. Calway Plus Botrytis sp ve Sclerotinia Sp vb. hastalıklara karşı bitkinin direncini ve bu hastalıklarla mücadelede kullanılan fungusitlerin de etkilendiğini artırır. Calway Plus bitki bünyesine alındığında hem fotosentezin dolaylı olarak hızlanmasına, bitkinin fizyolojik olarak rahatlamasına neden olur.

CALWAY

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%10
Toplam Azot (N)	%8
Nitrat Azotu (N)	%8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%11
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,05
pH Aralığı 4-6	

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Domates	Sezon boyu 3-4 uygulama. Sera: 250-300cc. Tarla: 400-450cc.
Biber, Patlıcan	2 uygulama (Döllenmeden sonra, meyve 5-8 cm büyüklüğünde iken), Sera: 250-300cc, Tarla: 400-500cc
Salatalık, Kabak	Gelişme döneminde 7-10 gün arayla 4-5 uygulama; Sera: 250-300cc, Tarla: 400-500cc.
Çilek	Döllenmeden sonra 8-10 gün arayla 2-3 uygulama; Sera: 250-300cc, Tarla: 400-500cc.
Kavun	1.Uygulama, meyveler yumurta büyüklüğünde iken: 1000cc./100lt. su, 2. ve 3. Uygulama 8-12 gün arayla; 2000cc./100lt. su
Karpuz	Meyve çapı 10-12 cm olduğunda, 8-10 arayla 2-3 uygulama 400-500cc.
Lahanagiller	Meyve ceviz iriliğine deldiğinde: 100lt. suya 250-300cc, 2-3 uygulama
Narenciye	Meyve ceviz iriliğine deldiğinde: 100lt. suya 250-300cc, 2-3 uygulama
Bağ	Meyve bağlandıktan sonra 100lt. suya 250 cc, 4-5 uygulama
Elma, Armut, Kiraz	400-500 cc.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Calway, kalsiyum, magnezyum, nitrik azotu ve molibden, içeren, bitkiler tarafından çok çabuk ve tamamen alınabilen, bitki bünyesinde taşınabilen özel bir karışımdır. Nitrat azotu sayesinde, içerdiği elementler hem yapraklar hem kökler tarafından çok çabuk bitki bünyesine alınır ve bitki içerisinde hızlı bir şekilde taşınır. Calway bitki tarafından bünyesine alındığında serum etkisi yaparak bitkinin iletim sistemlerinde besin ve suyun akışını da hızlandırır. Dolayısıyla bitkide meydana gelen sıcaklık, su ve beslenme yetersizliği- den kaynaklanan stresler minimuma özellikle sıcak dönemlerde yetiştirilen bitkiler de kalsiyum noksanlığında ya sıcaklığın direkt etkisi ya da su nem stresi dolayısıyla çiçek ve meyve dökülmeleri, salkım kurumaları, meyve renginde açılmalar, bitki genelinde solgunlaşmalar, çatlamalar vs. meydana gelir. Ayrıca direkt olarak sulamadan, toprak yapısından ve EC yüksekliğinden kaynaklanan stresler de kalsiyum noksanlığında oluşur.



Özellikle cam seralar da patlıcan, domates ve hıyar gibi bitkiler de nem yetersizliğinden veya dengesizliğinden renk açılmaları, sulama yetersizliğinden veya diğer sebeplerden dolayı magnezyum ve kalsiyum noksanlığı görülür. İşte Calway bu noksanlıkları ve arazları giderir. Calway tüm meyvelerde ve bitkinin yapraklarında canlılık ve parlaklık sağlar. Calway Botrytis sp ve Sclerotinia sp vb. hastalılara karşı bitkinin direncini ve bu hastalıklarla mücadelede kullanılan fungusitlerin de etkinliğini artırır. Calway bitki bünyesine alındığında hem fotosentezin dolaylı olarak hızlanmasına, bitkinin fizyolojik olarak rahatlamasına neden olur. Calway bitkinin pH'ını ayarlayarak, besin oluşumunu ve hareketliliğini artırır. Kalsiyum, Magnezyum ve Molibden bitkilerde ki ve toprakta ki kimyasal, biyokimyasal ve biyolojik aktiviteler için önemli elementlerdir.

EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ



Nutri Grow PZn, asidik ortamda sentez yoluyla elde edilen çinko-amonyum fosfat bazında bir ürün olup nitrik asitçe zenginleştirilmiştir. Özellikle erken dönemde, soğuk ve kireçli topraklarda bitkinin çinko ve fosfor ihtiyacını karşılayarak, mükemmel sonuçlar verir. Tohumların filizlenmesini ve kök gelişimini destekleyip bitkinin çalışmasını sağlar. Bitkinin bünyesindeki biyokimyasal aktivite için gereken enerjiyi sağlar.

NUTRI GROW PZn

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%3
Nitrat Azotu (N)	%1,6
Amonyum Azotu (N)	%1,4
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	%30
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%7

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Narenciye	Çiçekten önce yapraktan 100 litre suya 250 ml 2-3 uygulama
Meyve Ağaçları	Erken dönemde ve çiçekten önce damla sulama ile dekara 3-4lt. 2-3 uygulama. Yapraktan 200-250ml/100lt. dozunda uygulanır
Tahıl , Şeker Pancarı	Ot ilacı ile karıştırılarak dekara 3-4 lt. uygulanabilir
Mısır	Bitki boyu 10-15 cm olunca yapraktan 150-200cc. 2-3 uygulama yapılabilir
Bahçe Bitkileri	Çiçeklenmeyi teşvik etmek için yapraktan 100lt. su içerisine 300- 500 ml veya damla sulama ile dekara 2-3 lt. olarak 2-3 uygulama
Tarla bitkileri	Vejetatif gelişme döneminde düzenli olarak, bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, yapraktan 150-200ml/100 lt. dozunda uygulanır
Sebzeler	Vejetatif gelişme döneminde düzenli olarak damlama ve yağmurlama sulama yolu ile bitkinin ve toprağın pozisyonuna göre 2-3lt. /da dozunda her dönemde uygulanabilir
Çiçekler ve Süs Bitkileri	Büyüme dönemi başlangıcında dekara 2-2,5lt. dozunda 2-3 uygulama

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Çinko Triptofan isimli aminoasidin sentezinde katalizör görevi görür ve böylece doğal bir oksin olarak büyümeyi düzenler. Sürgünlerin büyümesini hızlandırır, düşük sıcaklıklarda da bile çiçeklenmenin sağlıklı ve düzenli olmasını sağlar.

Karışılabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

PROWAY^{Cu} FOLIAR

EC FERTİLİZER BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ

EC FERTİLİZER BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ

PROWAY^{Cu}

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%3

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Şeftali, Kayısı, Erik	Döllenmeden sonra ihtiyaca göre yapraktan dekara 150- 200 ml /100lt. su. Hasattan sonra dekara 250 ml/100lt. su
Narenciye, Bağ, Zeytin	Hasattan sonra yaprak dökümüne kadar dekara 150-200 ml/100lt. su.
Domates, Patates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye	Hasattan sonra yaprak dökümüne kadar dekara 150-200 ml /100lt. su. Meyve döneminde dekara 150 ml /100lt. su
Yapraklı Sebzeler	Başlangıç döneminde dekara 80-100 ml/100 lt suya, ihtiyaca göre 2-3 uygulama.
Elma, Armut, Kiraz	Hasattan sonra yaprak dökümüne kadar dekara 150-200 ml/100 lt.
Kesme Çiçekçilik	Dönem boyu 80-100 ml/ 100lt. suya. Dozlar dekara 100 lt. su olarak verilmiştir.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

Proway Cu Foliar, her toprakta ve koşulda kullanılabilen, bitki kökleri ve yaprakları tarafından kolayca ve tamamen alınan organik şelatlı sıvı bakırdır. Proway Cu Foliar'ın etkilere sağladığı diğer yararların dışında, iki temel kullanım amacı vardır; bitkiyi hastalıklara karşı dirençli kılmak ve fotosentezi hızlandırmak.

Proway Cu Foliar özellikle bakteriyel ve mantari hastalıklara karşı kullanıldığında, kökten ve yapraktan çok çabuk bir şekilde alınır ve taşınır. Alındığı ve taşındığı her yerde etkisini sistemik etki gösterir. Proway Cu Foliar

hastalıklara karşı bitkiyi korurken bitkinin bakır ihtiyacını da giderir. Bakır klorofil oluşumunu teşvik ederek, bitkinin fotosentez hızını da arttırmaktadır. Bakır eksikliğinde bitkide fotosentez faaliyeti yavaşlamakta ve buna bağlı tüm fizyolojik olumsuz etkilenmektedir.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.



Proway Cu, hastalıklara karşı bitkiyi korurken bitkinin bakır ihtiyacını da giderir. Bakır klorofil oluşumunu teşvik ederek, bitkinin fotosentez hızını da arttırmaktadır. Bakır eksikliğinde bitkide fotosentez faaliyeti yavaşlamakta ve buna bağlı tüm fizyolojik olumsuz etkilenmektedir. Proway Cu her toprakta ve koşulda kullanılabilen, bitki kökleri ve yaprakları tarafından kolayca ve tamamen alınan organik şelatlı sıvı bakırdır. Proway Cu'nun etkilere sağladığı diğer yararların dışında, iki temel kullanım amacı vardır; bitkiyi hastalıklara karşı dirençli kılmak ve

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%6,5

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Meyve Ağaçları, Şarap, Sofralık Üzüm, Sebze ve Endüstriyel Ürünler	Tüm ürün döngüsü boyunca ürün gereksinimlerine göre 2-3 lt. /da
Sera Bitkileri	Tüm ürün döngüsü boyunca ürün gereksinimlerine göre 1-1,5 lt. / 1000m ² Sadece zeytin üzerinde Proway Cu, tüm döngü boyunca 2-5.5 lt/da'lık bir dozda 4-5 yaprak uygulaması ile uygulanabilir.

Yapraktan veya damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

fotosentezi hızlandırmak. Proway Cu özellikle bakteriyel ve mantari hastalıklara karşı kullanıldığında, kökten ve yapraktan çok çabuk bir şekilde alınır ve taşınır. Alındığı ve taşındığı her yerde etkisini sistemik etki gösterir.

Karışabilirlik;

Tek kullanılması tavsiye edilir. Asidik karakterli ürünlerle ve ilaç grubu ile karıştırmayınız. Ayrıca kullanım konusunda ürünlere ve iklim şartlarına bağlı değişiklik gösterebileceği için teknik uzmanlarımıza danışınız.

VOLANS

EC FERTİLİZER
SIVI MİKRO BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	%5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%5

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Meyve Ağaçları ve Bağ (Şeftali, Erik, Elma, Kiraz, Armut, Kayısı)	Hasattan sonra, yaprak dökümü başlangıcından ortasına kadar dekara 200 gr uygulama yapılır. Özellikle ağaçlarda Proway Cu Foliar (100lt. suya 300ml.) ile beraber uygulanması tavsiye edilir.

Yapraktan uygulanır.

Volans, meyve ağaçları için özel olarak geliştirilmiş, glisinbetain aktivatörü ve etonolamin bazı bir üründür. Ek formülantlar sayesinde, besleyici iz elementler daha iyi şekilde bitki tarafından alınır. Hasat sonrası sonbahar döneminde meyve gözlerini besleyerek, çiçek organlarının daha iyi gelişmesini ve bitkiyi vejetatif döneme hazırlayarak daha güzel bir çiçeklenme ve dölllenme sağlar.

Karışabilirlik;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.



EC FERTİLİZER
KALSİYUM Klorür ÇÖZELTİSİ



CRATER

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%17

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Meyve Bahçeleri (Yapraktan uygulama)	Meyve tutumundan itibaren 10-15 günde bir uygulama 200-300ml /da
Sebzeler (Yapraktan uygulama)	Meyve tutumundan itibaren 8-10 günde bir uygulama 200-300ml /da
Yapraklı Sebzeler (Yapraktan uygulama)	Şaşırtma 8-10 gün sonrasında itibaren haftada bir uygulama 250-350ml /100lt.
Çiçekler ve Peyzaj Bitkileri (Yapraktan uygulama)	Sezon boyunca 8-10 günde bir uygulama 250-250ml /100lt damlama
Meyve Bahçeleri (Damlama)	Meyve tutumu dönemi sonrası 2-3 lt./da
Sebzeler (Damlama)	Meyve tutumu dönemi sonrası ve meyve büyüme dönemi 2-3 lt./da
Hububat (Damlama)	2-3 lt./da

SIVI DAMLAMA SERİSİ



- ACTIVE-N
- ACTIVE-P
- ACTIVE-K
- ACTIVE-S
- FLORA
- JAMMER
- WAY UP
- VEGAMIN
- BLACK FEED
- RENAT 40
- MAX K
- MAXWAY OMG
- MAXWAY 7-7-7
- MAXWAY CAL

ACTIVE-N

EC FERTİLİZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%25
Nitrat Azotu (N)	%2,5
Amonyum Azotu (N)	%2,5
Üre Azotu (N)	%20

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Narenciye, Meyve Ağaçları	Vejetatif gelişme başlangıcından meyve büyüme dönemine kadar 10-15 günde bir dekara 2-6 lt dozunda 4-5 uygulama.
Muz	Dekara 2-10 lt dozunda uygulama.
Tüm Sebzelerde	Damla sulama ve yağmurlama sulama yolu ile bitkinin ve toprağın pozisyonuna göre 2-4 lt/da dozunda. Her dönemde uygulanabilir.
Bahçe Bitkileri	Dönem boyu dekara 3 lt dozunda 5-6 uygulama yapınız.

Damla sulama ile uygulanır.



Toprak Uygulaması

EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

ACTIVE-P

3-25-0

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%3
Amonyum Azotu (N)	%3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%25

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Meyve Ağaçları	Vejetatif gelişme başlangıcından meyve büyüme döneminde kadar 10-15 günde bir, dekara 4-5 lt. dozunda 3-4 uygulama.
Bahçe Bitkileri	Dikimde, çiçek döneminde ve meyve büyüme döneminde dekara 3-4 lt dozunda 3-4 uygulama.
Kesme Çiçekçilik (Güller ve Asifofiller)	Dikimde ve dönem boyu dekara 3 lt dozunda en az 4-5 uygulama. Uygulama sayısı bitkilerin ihtiyacına göre değiştirilebilir. Gübreleme programında azot, kalsiyum, magnezyum, kültür ve tüm iz elementler dikkate alınarak fosfor uygulaması yapılır.

Sadece damla sulama yöntemiyle uygulanabilir.



ACTIVE-P Taban uygulamalarında yeni bir teknolojidir. Fosfor kaynağımız gelenekselden çok farklı olup 5 li bag sistemi ile ortaya çıkmış benzersiz bir çalışma anlayışa sahip bir fosfordur. Alınımı çok hızlı olup bitkideki reaksiyonları hızlıdır. Çiçek öncesi uygulamalarda homojen ve sağlıklı çiçek gelişi, kış uygulamalarında ise bir sonraki sezonun meyve gözlerini oluşturmada etkili bir çözüm sunar. Toprakta hareketi yavaş olan fosforunuzu ACTIVE taşıyıcılarla taşınması için ACTIVE-P yi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Bitkinin olumsuz toprak koşullarından dolayı almakta zorlandığı besin maddelerinin ve elementlerin bitki bünyesine alınmasına yardımcı olur.

Kötü hava şartlarından ve beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan streslere karşı bitkiyi korur. Gübrelere birlikte verildiğinde gübrelemenin etkinliğini artırır ve topraktan taşınımını artırır. Vejetasyonu teşvik eder.

- Homojen çiçeklenme.
- Toprak ıslahına yardımcı olur.
- Fidan ve yeni dikilmiş fidelerde kök teşviği sağlar.
- Fosfor ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılar.
- Dökme, spring sulama ile uygulanır.
- Düşük pH sayesinde bitki tarafından alımı hızlı olur.



Toprak Uygulaması

ACTIVE-S

TOPRAK pH DÜZENLEYİCİ

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

FLORA

3-30-0

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%25
---	-----

Uygulama Dozları
Damlamadan uygulamada 1-2 Lt/da; uygulama dozu tavsiye edilir. Uygulamalar 20 gün aralıklarla tekrarlanabilir.

Toprak Ph değerini 6.50'ye ayarlamak için sıvı kükürt miktarı lt/da				
Toprak Ph	8,5	8,0	7,5	7,0
Kumlu Toprak	3,5	2,5	1,5	1,0
Tınlı Toprak	4,5	3,5	2,5	1,5
Killi Toprak	5,0	4,0	3,0	2,0

Bazı ürünler için olması gereken ideal Ph değerleri			
Narenciye	5,0 - 6,5	Mısır	5,0 - 7,5
Muz	5,8 - 6,5	Buğday	5,5 - 7,5
Havuç	5,5 - 7,0	Soya	6,0 - 7,0
Kavun	6,7 - 7,2	Domates	6,3 - 6,8
Elma	5,0 - 6,5	Biber	6,6 - 7,0
Çilek	5,0 - 6,5	Hıyar	6,4 - 6,9

Karışılabilirlik:

Her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.


Toprak Uygulaması
Toprak Uygulaması

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%3
Amonyum Azotu (N)	%3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%30

Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Meyve Ağaçları	Vejetatif gelişme başlangıcında meyve büyüme dönemine kadar 10-15 günde bir, dekara 4-5 lt. dozunda 3-4 uygulama.
Bahçe Bitkileri	Dikimde, çiçek döneminde ve meyve büyüme döneminde dekara 3-4 lt. dozunda 3-4 uygulama.
Çiçekler ve Süs Bitkileri (Güller ve Asidofiller)	Dikimde ve dönem boyu dekara 3 lt. dozunda en az 4-5 uygulama. Uygulama sayısı bitkilerin ihtiyacına göre değiştirilebilir. Gübreleme programında azot, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve tüm iz elementler dikkate alınarak fosfor uygulaması yapılır.

Damla sulama ile uygulanır.

- Alkali ve/veya soğuk topraklarda alınamayan fosforun alınmasını sağlar.
- Soğuk dönemlerde görülen yaprak morarmalarını (antosiyen) engeller.
- Bitki hücre oluşumlarını destekler
- Meyve gelişim döneminde kök gelişimini teşvik eder.
- Vejetasyonun her döneminde bitkiye gerekli enerjiyi sağlar.



WAY UP

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Organik Madde	%35
Organik Karbon	%11
Toplam Azot (N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%5
pH Aralığı 4,5-6,5	

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Tüm Tarla Bitkileri ve Sebzeler	Yağmurlama veya damlama sulama yöntemleriyle bitkinin ve toprağın durumuna göre 1-3lt. /da dozunda uygulanabilir. Bahçe bitkilerinde damlama sulama yöntemiyle bitkinin ve toprağın durumuna göre 1-5lt. /da dozunda her dönemde uygulanabilir.

VİTAMİN ENZYME PLANT ACTIVATOR Toprak Uygulaması



WAY UP damla sulama için özel olarak geliştirilmiş düşük molekül ağırlıklı aminoasit ve peptid bazında organik azot ve deniz yosunu içeren özel bir üründür. Way Up yüksek bir çözünürlüğe sahiptir, dolayısıyla kökler tarafından kolayca alınabilir. Tüm bitkiler için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Topraktaki mikro florayı harekete geçirir. Köklenmeyi teşvik eder. Kesinlikle ağır metaller içermez.

- Fidan ve fideliklerde kök gelişimini sağlar.
- Stres koşullarında bitkilerin direncini yükseltir.
- Toprakta su tutma kapasitesini ve organik maddeyi artırır.

WAY UP yüksek bir çözünürlüğe sahiptir, dolayısıyla kökler tarafından kolayca alınabilir. Tüm bitkiler için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Topraktaki mikro florayı harekete geçirir. Köklenmeyi teşvik eder. Düzenli kullanıldığında topraktaki tuzluluğu giderir. Organik tarımda kullanılır.

EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Toprak Uygulaması



- Formülasyon içerisindeki özel ajanlar sayesinde toprak tansiyonunu (pH) çok hızlı bir şekilde düşürür.
- Suyun sertliğini giderir.
- Uygulamadan sonra toprak yapısını düzenleyip kök bölgesine suyun ve oksijenin oluşmasını sağladığından dolayı kök bölgesindeki stresi alıp, kök sisteminin daha sağlıklı çalışmasını teşvik eder.
- Ürün özelliğinden dolayı; yüksek pH sebebiyle toprak kolloidlerinde bağlanmış olan daha önceki uygulamalardan kalan makro ve mikro elementlerin süratle parçalanıp bitki bünyesine taşınmasını sağlar.
- Toprak tuzluluğunu azaltır.
- Damlama sulama borularını açar.
- Bitkinin Azot, Fosfor ve Kükürt eksikliğini gidermede etkin rol oynar.
- Toprağı kabartır.
- Düşük Ph ile alınmasıyla mikro elementlerin alımını sağlar.
- Üstün kükürt teknolojisi.
- Toprak yapısını ıslah ederek suyun geçirgenliğini artırır.

JAMMER

3-15-0+15SO₃

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%3
Üre Azotu (N)	%3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%15


Bitki	Kullanım Dozları ve Zamanı
Açık Tarla Sebzeleri	Domates, biber, patlıcan, hıyar, fasulye, kavun, karpuz, vs. Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile 2-2,5lt. /da
Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile 2-2,5lt. /da
Bağlar	Aktif gelişme döneminde 2-3lt. /da
Narenciye	Baharda sürgün gelişimi boyunca 10 gün ara ile 2-3lt. /da
Meyve Ağaçları	Vejetatif gelişme dönemi boyunca 1-2 hafta ara ile 2-2,5lt. /da
Çilek	Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama 2-2,5lt. /da
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası 2-3lt. /da
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	Aktif gelişme döneminde başaklanma öncesi 2-3lt. /da
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası 2-3lt. /da
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca 2-2,5lt. /da
Fındık	Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3lt. /da Toprakтан uygulamalarda ekim ve dikim öncesi 3-4lt. /da dozunda uygulama yapılabilir.

Damla sulama ile uygulanabilir. Yapraktan uygulama kesinlikle tavsiye edilmez.



ORGANİK GÜBRE BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

Применение в Почву



Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%45
Organik Karbon	%15
Organik Azot	%3
Serbest Amino Asit	%6
pH aralığı: 3 - 5	

Karışılabilirlik: Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla uygulamadan önce küçük dozlarda denemeniz önerilir. Alkali ürünlerle birlikte uygulama yapmayınız. Asla uygun doz önerilerini aşmayınız. Gerekli yerlerde kullanınız. **Önerilenin haricindeki uygulamalardan kaynaklanan olumsuzluklardan firmamız sorumlu değildir.**

VEGAMIN

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Karpuz-Kavun Kabak	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Fasulye-Nohut Mercimek	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Çilek	Fide dikiminden 10-15 gün sonra çiçeklenme döneminden itibaren damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Bağ - Kivi	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasada kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Muz	Damla sulamadan her gübreleme ile dekara 2-4 Litre uygulanabilir.
Narenciye	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde hasata sonuna kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Kiraz-Vişne-Şeftali Kayısı-Erik	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasat sonuna kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Elma-Armut-Ayva	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasat sonuna kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Zeytin	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasat sonuna kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Fındık-Ceviz Antep Fıstığı	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasat sonuna kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Patates-Havuç	Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkışından sonra hasata kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Soğan - Sarımsak	Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkışından sonra hasata kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Pamuk	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasat sonuna kadar damla sulamadan dekara 2-4 Litre
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvrıcık, Lahana vb.)	Gelişme dönemi boyunca damlama sulama ile dekara 2-4 Litre
Yeşil alanlar, kesme çiçekçilik	Fide dikiminden ya da çiçek kesiminden itibaren gelişme dönemi boyunca damla sulamadan dekara 2-4 Litre

BLACKFEED

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%45
Organik Karbon	%15
Toplam Azot (N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%5
pH Aralığı 4,5-6,5	

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Tüm Bitkilerde	Tüm bitkilerde damla sulama yoluyla uygulanır. Yapraktan uygulamalarda 100 lt. suya 150-300cc dozunda. İlk çiçekten hasat sonuna kadar dekara 3-5lt. uygulayınız. Yetiştirme sezonu boyunca 10-15 gün aralıklarla 6-8 uygulama tavsiye edilir. Günün serin saatlerinde uygulayınız.

İçerisindeki yüksek organik madde bitki besin elementlerinin ve topraktaki mikro organizma faaliyetlerinin artmasına ve bitkinin kök yapısındaki emici tüylerin artışı sağlar. Böylece Black Feed bitki besin elementi alımlarını kolaylaştıran bir katalizör görevi görmektedir.

- Su tutma kapasitesini artırır.
- Topraktaki organik madde miktarını artırır.
- Makro ve Mikro bitki besin elementlerin alımını kolaylaştırır.

Karışılabilirlik: Azotlu gübreler ile beraber verilebilir.
Gübre alımını kolaylaştırır.

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE



Toprak Uygulaması

EC FERTİLİZER NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAX K



Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%3
Üre Azotu (N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%30

EC FERTİLİZER NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

MAXWAY 7-7-7

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	%7
Amonyum Azotu (N)	%5
Üre Azotu (N)	%2
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%7



EC FERTİLİZER MAGNEZYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

MAXWAY OMG



Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%13

EC FERTİLİZER KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

MAXWAYCAL

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%13



Maxway serisi damla sulama için geliştirdiğimiz asit karakterli sıvı gübrelerdir. Her türlü toprak, özellikle pH'ı ve tuzluluğu yüksek olan topraklar için idealdir. Geliştirdiğimiz formülasyonlar diğer NPK'lar ile uyumlu ve karışabilir iz elementler, kalsiyum ve magnezyum bazında olduğundan içeriğine göre bitkinin fenolojik dönemlerine bağlı olarak tüm sezon boyunca bir program oluşturularak kullanılabilir.

Spesifik kompleksleme ve şelatlama maddeleri içerdiğinden, toprakta bağlı olan besin elementlerini çözüp harekete geçirir ve böylece toprağın doğal verimliliğini artırır. Maxway kullanımında uygulama dozları toz NPK gübrelerle oranla %15-20 kadar daha düşüktür. Solüsyon pH'sının düşük olmasından içerdiği kompleksleme ve

şelatlama maddelerinin koruyucu ve element taşıyıcı özeliğe sahip olmasından dolayı daha üstün sonuçlar verir.

Maxway uygulaması çok pratiktir. Suda eritmeden direkt damlama sulama sistemine verilir. Stabil solüsyon sayesinde maksimum alınabilirlik özelliğine sahiptir. Toprakta ve suda bikarbonatlar ve pH anormallüğinden kaynaklanan problemlere son verir. Damlama sulama lateallerinde tortu bırakmaz.

Tüm bitkilerde dikimden sonra veya vejetatif gelişme başlangıcından itibaren hasada kadar dekara 2,5-5 lt. dozunda uygulanır. Fenolojik dönem ve bitkinin ihtiyacına göre formülasyon seçimi yapılmalıdır.

RENAT 40

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Organik Madde	%40
Organik Karbon	%11
Toplam Azot	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%1
pH Aralığı 4,5-6,5	

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Tüm Bitkiler	Tüm bitkilerde damla sulama yoluyla uygulanır. İlk çiçekten hasat sonuna kadar dekara 2-4 lt uygulayınız. Yetiştirme sezonu boyunca 10-15 gün aralıklarla 6-8 uygulama tavsiye edilir. Günün serin saatlerinde uygulayınız.

RENAT 40 damla sulama için özel olarak geliştirilmiş özel bitki aktivatörleri, toprak düzenleyiciler ve peptid bazında organik azot içeren özel bir üründür. Kesinlikle ağır metaller içermez.

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE



Toprak Uygulaması

TOZ DAMLAMA SERİSİ



- 10-0-20+(15CaO)
- 3-5-55+TE
- 17-44-0+TE
- 10-52-10+TE
- 18-18-18+TE
- 15-30-15+(2MgO)+TE
- 15-5-30+(2MgO)+TE
- 0-40-40+TE
- 16-8-24+(2MgO)+(10SO₃)+TE

VİTAMİN

ENZYME

PLANT
ACTIVATOR



10-0-20+(15CaO)

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	%10
Nitrat Azotu	(N)	%10
Suda Çözünür Potasyum Oksit	(K ₂ O)	%20
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit	(CaO)	%15

17-44-0+TE

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	%17
Üre Azotu	(N)	%17
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%44

10-52-10+TE

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	%10
Amonyum Azotu	(N)	%7
Üre Azotu	(N)	%3
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%52
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%52
Suda Çözünür Potasyum Oksit	(K ₂ O)	%10
Suda Çözünür Bor	(B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır	(Cu)	%0,02
Suda Çözünür Demir	(Fe)	%0,03
Suda Çözünür Mangan	(Mn)	%0,01
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	%0,007
Suda Çözünür Çinko	(Zn)	%0,02

3-5-55+TE

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	%3
Nitrat Azotu	(N)	%3
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit	(K ₂ O)	%55
Suda Çözünür Bor	(B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Fe)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Mn)	%0,01
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	%0,003
Suda Çözünür Çinko (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Zn)	%0,02

18-18-18+TE

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	%18
Amonyum Azot	(N)	%9
Nitrat Azot	(N)	%9
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Potasyum Oksit	(K ₂ O)	%18
Suda Çözünür Bor	(B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Fe)	%0,03
Suda Çözünür Mangan (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Mn)	%0,02
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	%0,007
Suda Çözünür Çinko (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Zn)	%0,02
Stabil pH aralığı: 3-13		

15-30-15+(2MgO)+TE

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	%15
Amonyum Azotu	(N)	%5,5
Nitrat Azotu	(N)	%5
Üre Azotu	(N)	%4,5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%30
Suda Çözünür Potasyum Oksit	(K ₂ O)	%15
Suda Çözünür Magnezyum Oksit	(MgO)	%2
Suda Çözünür Bor	(B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Fe)	%0,03
Suda Çözünür Mangan (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Mn)	%0,02
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	%0,007
Suda Çözünür Çinko (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Zn)	%0,02
Stabil pH aralığı: 3-13		

0-40-40+TE

Garanti Edilen İçerik		w/w
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Potasyum Oksit	(K ₂ O)	%40
Suda Çözünür Bor	(B)	%0,01
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	%0,007
Suda Çözünür Çinko (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Zn)	%0,02
Suda Çözünür Bakır (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Cu)	%0,01

- Hızlı çözünürlüğe sahip.
- Magnezyum ve mikro elementler içeren.
- Kalsiyum ile özel formüle edilmiş karışımlar.
- Asidik karakterli formülasyonlar.

Ağır metal ve klor içermez.

Growway NPK formülasyonları en güvenli, etkili şekilde çalışmasının sebebi kullanılan ham maddelerin kaliteli olması ve özel katkılarla zenginleştirilmiş formülasyonlara sahip olmasıdır.

15-5-30+(2MgO)+TE

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	%15
Amonyum Azotu	(N)	%4
Nitrat Azotu	(N)	%8
Üre Azotu	(N)	%3
Suda Çözünür Pentaoksit (P ₂ O ₅)		%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit	(K ₂ O)	%30
Suda Çözünür Magnezyum Oksit	(MgO)	%2
Suda Çözünür Bor	(B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Cu)	%0,015
Suda Çözünür Demir (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Fe)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Mn)	%0,01
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	%0,007
Suda Çözünür Çinko	(Zn)	%0,014
EDTA Şelatlı Stabil Olduğu pH Aralığı Cu,Fe,Mn,Zn için 3-13		

16-8-24+(2MgO)+(10SO₃)+TE

Garanti Edilen İçerik		w/w
Toplam Azot	(N)	%16
Amonyum Azot	(N)	%6,5
Nitrat Azot	(N)	%9,5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	(P ₂ O ₅)	%8
Suda Çözünür Potasyum Oksit	(K ₂ O)	%24
Suda Çözünür Magnezyum Oksit	(MgO)	%2
Suda Çözünür Kükürt Trioksit	(SO ₃)	%10
Suda Çözünür Bor	(B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Fe)	%0,03
Suda Çözünür Mangan (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Mn)	%0,02
Suda Çözünür Molibden	(Mo)	%0,007
Suda Çözünür Çinko (Tamamen EDTA Şelatlı)	(Zn)	%0,02
Stabil pH aralığı: 3-13		

“DOĞRU GÜBRE, MAKSİMUM VERİM!”



GROWWAY

“The new solutions ”



Türkiye Distribütörü:
T.T.T. Toros Tohumculuk ve Tarım Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim: 0322 458 91 61 • 0322 459 67 57 • Sümer Mh. 69122 Sk. Fikircioğlu Ap. No:6 D:1
Seyhan / Adana / Türkiye

www.growway.com.tr •    /growwaytr

Growway, Bir Adafer Gübre Markasıdır.